



Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

Центар за контролу и превенцију болести
Бр: 04-сп
Датум: 14.10.2021. године

Вакцинација против грипа

Институт за јавно здравље Војводине је преузео инактивисану четворовалентну вакцину против грипа за сезону 2021/2022. Према препорукама Светске здравствене организације за северну хемисферу и Одлуком Европске Уније, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса грипа А (H1N1)pdm, А (H3N2) и две линије (Victoria и Yamagata) типа В.

Као и претходне године, слично пракси земаља Европске Уније и САД, у примени је четворовалентна вакцина против грипа. Ова вакцина је безбедна и ефикасна у спречавању оболевања од грипа, потреба за хоспитализацијом због компликација основне болести и умирања због грипа. Њеном применом, спречава се 16% више случајева грипа него применом тровалентне (А (H1N1), А (H3N2) и једна линија типа Б) вакцине против грипа истог произвођача.

Обзиром да се заштитна антитела против грипа стварају након 2 недеље, вакцинација против грипа се препоручује пре почетка сезоне грипа (идеално у октобру и новембру), али је вакцинација оправдана и током остатка сезоне грипа, односно све док је вирус грипа присутан у популацији. Обавезно давање вакцине против грипа је усмерено на популацију која је у највећем ризику од настанка озбиљних компликација (труднице и све особе са хроничним поремећајима кардиоваскуларног и плућног система, укључујући астму, дијабетес, хронична обољења бубрега и јетре и дегенеративним обољењима), али и на здравствене раднике који раде на одељењима са повећаним ризиком. Вакцина се препоручује и особама са малигним обољењима и ослабљеним имуним системом. За штићенике и запослене у институцијама за стара лица (геронтолошки центри) и установама социјалне заштите, такође је обавезно спровођење имунизације против грипа. Вакцина се може давати и током дојења.

Узраст за вакцинацију: преузета вакцина је намењена вакцинацији у узрасту од 6 месеци и старијих. Код деце која претходно нису вакцинисана, а узраста су од 6 месеци до 9 година, другу дозу вакцине против грипа је потребно дати након најмање 4 недеље од датума апликације прве дозе. Сва лица узраста 9 година и старији вакцинишу се само једном дозом вакцине, без обзира на то да ли су раније вакцинисани против грипа.

Контраиндикације за вакцинацију против грипа су уобичајене опште контраиндикације: повишена телесна температура, акутна болест и алергија на неке од компоненти вакцине, као што су алергија на јаја-овоалбумин, кокошије протеине, формалдехид, неомицин, октоксинол-9 и друге састојке наведене у сажетку карактеристика лека.

Нежељене реакције након вакцинације су по правилу благе и повлаче се без терапије унутар 1-3 дана, без терапије. Могу бити локалне (црвенило, оток и бол на месту апликације вакцине) или опште (најчешће главобоља, поспаност, умор, губитак апетита, слабост).

Вакцина против грипа и вакцине против COVID-19 се могу дати истовремено (у различите екстремитете) или у било ком временском размаку.