



Футошка 121, 21000 Нови Сад  
Централа: (021) 422-255; 4897-800  
Директор: (021) 6622-784; 4897-886  
Факс: (021) 6613-989  
E-mail: [izjzv@izjzv.org.rs](mailto:izjzv@izjzv.org.rs)  
[www.izjzv.org.rs](http://www.izjzv.org.rs)

Центар за контролу и превенцију болести  
Бр: 04-сп  
Датум: 29.09.2017. године

### Вакцинација против грипа

Институту за јавно здравље Војводине испоручена је вакцина против грипа за сезону 2017/2018. У питању је тровалентна, инактивисана вакцина, произвођача *Sanofi Pasteur*. У складу са препоруком Светске здравствене организације за северну хемисферу, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса грипа А (H1N1), А (H3N2) и типа В, са следећим сојевима:

- Ag virusa A tip: *A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus*
- Ag virusa A tip: *A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus*
- Ag virusa B tip: *B/Brisbane/60/2008-like virus*

Испоручене количине од 18.750 доза су у складу са исказаним потребама домова здравља на територији Јужнобачког округа. За територију Дома здравља Нови Сад одређено је 9.800 доза вакцине. У току је дистрибуција вакцине домовима здравља како би у најкраћем року започела кампања вакцинације.

Због чињенице да се заштитна антитела против грипа стварају након 2 недеље, вакцинација против грипа се препоручује у преепидемијском периоду (идеално у октобру и новембру), али је вакцинација оправдана и током остатка сезоне грипа, односно све док је вирус грипа присутан у популацији.

Давање вакцине против грипа треба да буде усмерено на популацију која је у највећем ризику од настанка озбиљних компликација (старије особе и особе са хроничним и дегенеративним обољењима), али и на здравствене раднике, који могу да даље шире инфекцију на болеснике у повећаном ризику. Штићеници у институцијама за стара лица (геронтолошки центри) су у високом ризику од настанка компликација и њихова заштита вакцинацијом има приоритет. Нажалост, у Покрајини, као и у читавој земљи, у групи здравствених радника и даље се бележе ниске стопе вакцинисаних против грипа.

Такође, вакцинација против грипа се препоручује и трудницама и гојазним особама, без обзира на претходни вакцинални статус против грипа, које су, после пандемијске 2009/10 године, идентификоване као нове групе ризика за оболевање од грипа. Према упутству произвођача вакцине, примена вакцине против грипа код трудница је дозвољена током целог периода трудноће, као и током периода лактације.

У складу са важећим Правилником, најмлађи препоручен узраст за спровођење имунизације је 6 месеци. Код деце која претходно нису вакцинисана, а млађа су од 8 година, другу дозу вакцине против грипа је потребно дати након најмање 4 недеље од датума апликације прве дозе. Сва лица старија од 8 година вакцинишу се само једном дозом вакцине против грипа.

Контраиндикације за вакцинацију против грипа су уобичајене опште контраиндикације (повишена телесна температура, акутна заразна болест и алергија на неке од компоненти вакцине, као што су алергија на јаја-овоалбумин, кокошије протеине, неомицин и формалдехид).

Нежељене реакције након вакцинације су по правилу благе (црвенило, оток и бол на месту апликације вакцине, главобоља, знојење, мијалгије, артралгије, малаксалост) и повлаче се унутар 1-2 дана, без терапије.